

## 2 Vergleich weiterer Inhaltsstoffe und Energiegehalte 2011 bis 2017

von Maissilageproben; 2017: 2.121 ausgewertete Proben

	Mittelwerte/Schwankungsbreiten 2 %- 98 %-Perzentil)							
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Zielwerte
<b>Rohasche</b> (% der T)	<b>3,6</b> (2,7 – 4,8)	4,1	4,1	3,9	4,0	4,0	3,9	< 4,5
<b>Rohfaser</b> (% der T)	<b>19,1</b> (15,8 – 23,5)	20,1	18,7	18,6	18,6	20,3	19,6	17 – 20
<b>ADFom</b> (% der T)	<b>23,1</b> (19,5 – 27,6)	23,2	22,2	22,6	22,1	23,1	22,7	20 – 25
<b>aNDFom</b> (% der T)	<b>39,4</b> (32,8 – 48,5)	41,6	38,2	37,5	40,0	41,5	40,5	35 – 40
<b>Rohfett</b> (% der T)	<b>3,5</b> (2,6 – 4,4)	3,6	3,4	3,6	3,6	3,4	3,4	
<b>ELOS</b> (% der T)	<b>68,2</b> (60,7 – 73,8)	68,0	68,5	68,6	69,8	68,6	68,3	> 65
<b>Strukturwert</b>	<b>1,6</b> (1,3 – 2,0)	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	
<b>pH Wert</b>	<b>3,9</b> (3,6 – 5,1)	3,9	3,9	3,9	4,0	3,9	4,0	4 – 5

Auswertung der Ergebnisse bis zum 28. 11. 2017