

# Zugelassene Herbizide im Möhrenanbau für die Saison 2017 - Stand Februar 2017

Präparat / Wirkstoff	Zulassung bis	Aufwandmenge Wartezeit	Schadorganismus	Anwendungszeitpunkt, Bemerkungen
<b>Focus Ultra</b> <i>Cycloxydim</i>	31.12.2025	2,5 l/ha; max. 1x 35 Tage	einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide (ausg. Einjähriges Rispengras)	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen (ab BBCH 11); Stadium Unkraut: 2-Blatt-Stadium bis 9 oder mehr Seitentriebe/Bestockungstriebe sichtbar (BBCH 12-29)
	31.12.2025	5,0 l/ha; max. 1x 35 Tage	Gemeine Quecke	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen (ab BBCH 11); Stadium Unkraut: nach dem Auflaufen, bei Unkrauthöhe bis ca. 25 cm
<b>Fusilade Max</b> <i>Fluazifop-P</i>	31.12.2022	1,0 l/ha; max. 1x 49 Tage	einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide (ausg. Einjähriges Rispengras)	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen; Stadium Unkraut: 2-Blatt-Stadium bis 1. Seitentrieb/Bestockungstrieb sichtbar (BBCH 12-21)
<b>Gallant Super</b> <i>Haloxypop-P</i>	31.12.2022	0,5 l/ha; max. 1x 56 Tage	einkeimblättrige Unkräuter	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen; Frühjahr Stadium Unkraut: nach dem Auflaufen
<b>Targa Super; Dinagam</b> <i>Quizalofop-P</i>	31.12.2020	1,25 l/ha; max. 1x 42 Tage	einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausg. Einjähriges Rispengras)	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen (BBCH 10-49); Stadium Unkraut: 2-Blatt-Stadium bis 9 oder mehr Seitentriebe/ Bestockungstriebe sichtbar (BBCH 12-29)
		2,0 l/ha; max. 1x 42 Tage	Gemeine Quecke	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen (BBCH 10-49); Stadium Unkraut: bei 15 bis 20 cm Unkrauthöhe
<b>Targa Max</b> <i>Quizalofop-P</i>	31.12.2020	0,6 l/ha; max. 1x 42 Tage	einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausg. Einjähriges Rispengras)	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen (BBCH 10-49); Stadium Unkraut: 2-Blatt-Stadium bis 9 oder mehr Seitentriebe/ Bestockungstriebe sichtbar (BBCH 12-29)
		1,25 l/ha; max. 1x 42 Tage	Gemeine Quecke	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen (BBCH 10-49); Stadium Unkraut: bei 15 bis 20 cm Unkrauthöhe
<b>Roundup Rekord</b> <i>Glyphosat</i>	31.12.2024	33%; max. 1x; max. Mittelaufwand 5 kg/ha F	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; schwer bekämpfbare Unkräuter	während der Vegetationsperiode, streichen; zur gezielten Einzelpflanzenbehandlung
<b>Roundup Power Flex</b> <i>Glyphosat</i>	31.12.2022	3,75 l/ha; max. 1x F	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Spritzen, Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung Stadium Kultur: bis zum Beginn des Dickenwachstums (BBCH 41), Stadium Unkraut: nach dem Auflaufen
<b>Bandur</b> <i>Aclonifen</i>	31.12.2024	3,0 l/ha; max. 1x 90 Tage	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker- Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras	Stadium Kultur: vor dem Auflaufen; auch in Bundmöhren
	31.12.2024	im Splittingverfahren, max. 2x; 1. Beh. 1,5 l/ha, 2. Beh. 1,0 l/ha 90 Tage		im Splitting: 1. Behandlung vor dem Auflaufen der Möhren, 2. Behandlung nach dem Auflaufen im 3-Blatt-Stadium (BBCH 13); auch in Bundmöhren
<b>Centium 36 CS</b> <i>Clomazone</i>	31.12.2025	0,25 l/ha; max. 1x F	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Stadium Kultur: vor dem Auflaufen bis 5 Tage nach der Saat (BBCH 00-09); Stadium Unkräuter: vor dem Auflaufen (BBCH 00-09)
<b>Sencor Liquid</b> <i>Metribuzin</i>	31.12.2022	0,3 l/ha; max. 1 x 42 Tage	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut)	nach dem Auflaufen, Stadium Kultur: 3 bis 4-Blatt-Stadium (BBCH 13-14)
		im Splittingverfahren, max. 2 x; 1. Beh. 0,1 l/ha, 2. Beh. 0,2 l/ha 42 Tage		im Splittingverfahren, 2 Behandlungen im Abstand von 7 - 14 Tagen, nach dem Auflaufen, Stadium Kultur: 2 bis 5-Blatt-Stadium (BBCH 12-15)
<b>Sencor WG</b> <i>Metribuzin</i>	31.12.2016 Abverkaufsfrist bis 30.06.2017 Aufbrauchfrist bis 30.06.2018	0,3 kg/ha; max. 1x 42 Tage	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut)	nach dem Auflaufen; Stadium Kultur: 3. bis 4. Laubblatt entfaltet
<b>Stomp Aqua; Stomp Raps</b> <i>Pendimethalin</i>	31.12.2017	im Splittingverfahren, 1,75 l/ha; max. 2x Abstand: 2-5 Wochen; 42 Tage	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut, Acker-Hundskamille, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Gemeines Kreuzkraut)	im Splitting: 1. Behandlung vor dem Auflaufen der Möhren, 2. Behandlung nach dem Auflaufen im 2-3-Blatt-Stadium (BBCH 12-13) bis zum 1-Blatt- Stadium der Unkräuter
	31.12.2017	3,5 l/ha; max. 1x F	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut)	Stadium Kultur: vor dem Auflaufen Schäden an nachgebauten zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten und Winterraps möglich
In Niedersachsen nach einem Antrag auf einzelbetriebliche Genehmigung nach §22 möglich:				
<b>Betasana SC</b> Phenmedipham	31.03.2016	3,0 l/ha; 2x 60 Tage	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	nach dem Auflaufen; Stadium Unkräuter 1-3-Blatt (BBCH 11-13)

Zusätzlich können in Möhren bis zwei Tage vor der Saat noch verschiedene Glyphosat-Präparate gegen bereits vorhandene Unkräuter eingesetzt werden  
Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen sind die aktuelle Zulassungssituation und die Gebrauchsanleitung genau zu beachten!